

你/妳為什麼要知道 茲卡病毒感染症？



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

疫情通報及諮詢專線：1922

廣告



新北市政府衛生局
防疫專線：02-2258-6923
<http://www.health.ntpc.gov.tw>



Q. 感染茲卡病毒會有什麼症狀？



- ✓ 感染到茲卡病毒約為**3至7天（最長達12天）**開始出現**典型症狀**，但約有75%的人無明顯症狀。

典型症狀



關節疼痛




發燒

頭痛



斑丘疹



結膜炎



Q.茲卡病毒如何傳播？



- ✓ 主要是被帶有茲卡病毒的病媒蚊叮咬而感染，臺灣可傳播茲卡病毒的病媒蚊為**埃及斑蚊**及**白線斑蚊**。
- ✓ 病媒蚊對於叮咬對象並**無選擇性**，任何人都有可能會被叮咬後感染。



埃及斑蚊

喜歡棲息於室內的人工容器
或是人為所造成積水的地方



白線斑蚊

比較喜歡棲息於室外

Q. 目前哪些地方有茲卡病毒流行？



- ✓ 主要集中於**中南美洲及加勒比海地區**，歐洲及美加地區亦有零星境外移入病例發生。

警示



注意



Q.現在可以去有茲卡病毒感染症的流行地區嗎？




- ✓ 如果你正在懷孕，建議暫緩前往。
- ✓ 一般民眾，若必需前往應做好**防蚊措施**。

1



出國前，可先至國內
旅遊醫學門診評估，
並做好防護措施。

3



住在有**紗窗**、
紗門或**空調**的房舍
避免被蚊蟲叮咬。

2



請穿**淺色長袖衣褲**、塗抹
衛福部核可含敵避（DEET）的
防蚊藥劑，做好防蚊措施。

Q.為什麼孕婦需要特別注意？



- ✓ 因為孕婦感染有可能導致胎兒**小頭畸形**或死亡。
- ✓ 孕婦或正準備懷孕的女性朋友，都是需要高度小心防範的對象唷！



孕婦



計畫
懷孕
婦女

暫緩前往
流行地區

Q.孕婦在懷孕期間被茲卡病毒感染怎麼辦？



✓懷孕婦女如經確診為茲卡病毒感染症，應**每隔3至4週**定期進行**胎兒超音波檢查**，以追蹤胎兒生長情形。



Q.如果近期曾前往流行地區， 返國後該注意些什麼？



- ✓ 如在流行地區旅遊期間或返國**2週內**，有出現發燒，皮疹，關節痛和結膜炎等相關症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史。



Q. 感染茲卡病毒要怎麼治療？



- ✓ 目前茲卡病毒感染無疫苗可預防、無抗病毒藥物可治療，建議以症狀治療。
- ✓ 如需退燒，**請勿使用**阿斯匹靈或任何非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs)。



Q.茲卡病毒有快速診斷的方法嗎？



- ✓ 目前尚無茲卡病毒的快速診斷試劑。
- ✓ 如於旅遊期間或返國**2週後**均無疑似感染症狀，無需檢驗；如有流行地區旅遊史且出現疑似症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史。

